



ORDU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
PERİODONTOLOJİ BİLGİLENDİRME VE TEDAVİ ONAM FORMU

DOK.KODU:HD.RB.17 YAY.TRH:22.07.2012 REV.TRH:01.10.2017 REV.NO:02 SAYFA NO:1 / 2

Sayın hasta / vekili yasal temsilcisi;

Bu form diş tedavileri sürecindeki olası risk ve komplikasyonları (istenmeyen sonuçları) hakkında bilgilendirmeye yöneliktir. Tedaviye başlamadan önce hastaların sistemik rahatsızlıklarını (kalp, şeker ve kan hastalığı, tansiyon, guatr, epilepsi vb.) bulaşıcı bir hastalığı (hepatit gibi) kemoterapi ve radyoterapi görüyorsa, hamile veya hamilelik şüphesi varsa, astım ve herhangi bir ilaca karşı alerjisi bulunuyorsa, varsa kullandığı ilaçları hekimiyle paylaşması hem kendi güvenliği hem de hekim için önemlidir.

Dişhekiminiz tarafından uygulanacak tedaviler hakkında aşağıda verilen bilgilendirme formunu dikkatle okuyup formu imzalayınız.Anlayamadığımız hususların hekiminiz tarafından açıklanmasını isteyiniz

ANAMNEZ

Tarih :Adı Soyadı:

Hepatit(sarılık) A,B,C geçirdiniz mi? :>Tedavi oldunuz mu?.....

HIV(AIDS) geçirdiniz mi? :

Diabet(şeker) hastalığınız var mı? :>Hangi ilacı kullanıyorsunuz? :

En son kan şekeri ölçüm değeriniz nedir? :

Herhangi bir ilaca, metale veya maddeye karşı alerjiniz var mı? :

Kalp probleminiz var mı? :> Hangi ilacı kullanıyorsunuz? :

Ameliyat geçirdiniz mi? :

Çocuklukta ateşli hastalık geçirdiniz mi? :>Kalpte sekel-arıza-hasar bıraktı mı?.....

Tansiyon probleminiz var mı? :> Hangi ilacı kullanıyorsunuz? :

En son tansiyon ölçüm değeriniz nedir? :

Hamile misiniz? :

Herhangi bir kan hastalığınız var mı? :

Başka herhangi bir hastalığınız-hastalığınız var mı? :

Daha önce diş çektirdiniz mi? :> Diş çekimi sırasında bir problemle karşılaştınız mı?.....

TEDAVİ ve İŞLEMLER

Lokal Anestezi

Tedaviler esnasında ağrı kontrolünü sağlamak amacıyla lokal anestezi uygulanmaktadır. Gerekli hallerde öncelikle topikal anestetik madde(sprey) ile dişeti veya yanağın iç kısmı uyuşturulur.

Olası riskler: Lokal anestezi uygulaması sonrası nadir de olsa hastada alerjik reaksiyonlar, his kaybı, kanama, kas spazmları, geçici yüz felci görülebilir. Bölgede anatomik farklılıklar veya akut enfeksiyonlar varsa anestezi başarısız olabilir. Lokal anestezi uygulanan bölge yaklaşık 2-4 saat boyunca hissizdir. Bu nedenle ısırma ya da yanık yanık için ve dudakta yara oluşmaması için hissizlik geçene kadar yeme,içme önerilmez.



ORDU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

PERİODONTOLOJİ BİLGİLENDİRME VE TEDAVİ ONAM FORMU

DOK.KODU:HD.RB.17

YAY.TRH:22.07.2012

REV.TRH:01.10.2017

REV.NO:02

SAYFA NO:2 / 2

ÖNERİLEN TEDAVİ

Diş taşı temizliği

Diş taşı temizliği hekimi tarafından diş taşı temizliği yapılarak uzaklaştırılır. Diş taşı temizliği el aletleriyle ve/veya ultrasonik aletlerle yapılır, 3-4 seans sürebilir. **Olası riskler:** İstenilen ağız bakımı yapılmaz ise tedavi edilmiş alanlarla iyileşme olmaz. İyileşmeyi takiben dişeti çekilmesi meydana gelebilir. Dişeti çekilmesinin miktarı, dişeti cebinin ilk derinliğine ve dişeti hastalığının derecesine bağlıdır. Sonuç olarak, diş kökünün bazı bölümleri açığa çıkararak dişin daha uzun görünmesine, soğuk-sıcağa karşı daha duyarlı olmasına sebep olabilir. Dişlerde hareketlilik artışı olabilir.

Subgingival Küretaj

Dişetlerindeki iltihabi durumun ilerleyip çevresindeki kemiği de etkilemesi sonucu periodontal dokularda yıkım meydana gelir. Bu yıkımı durdurmak ve etkenleri ortadan kaldırmak amacı ile ya da dokuları ileri periodontal cerrahi tedavilere hazırlamak amacıyla subgingival küretaj işlemi uygulanır. **Olası riskler:** İyileşmeyi takiben dişeti çekilmesi gözlenebilir. Dişeti çekilmesinin miktarı dişeti cebinin ilk derinliğine ve dişeti hastalığının derecesine bağlıdır. Sonuç olarak, diş kökünün bazı bölümleri açığa çıkararak dişin daha uzun görünmesine, soğuk-sıcağa karşı daha duyarlı olmasına sebep olabilir. İşlem sonrası birkaç gün kanama, ağrı ve dişlerde hareketlilik olabilir.

Periodontal Apse Tedavisi

Periodontal apse akut veya kronik olabilir. Akut durumda şiddetli ağrı, şişlik, lenfadenopati, ateş ve halsizlik görülür. Bu durumda hastaya antibiyotik vererek tedaviye başlanır. Antibiyotik kullanımının ardından tedaviye başlanır, apse drene edilir. Bunun için bölgeye lokal anestezi uygulanır ve subgingival küretaj yapılır. Gerekli durumlarda flep cerrahisi yapılır. Eğer apse kronik ise çoğunlukla antibiyotik tedavisi yapılmadan tedaviye başlanır.

Aşırı kole hassasiyeti tedavisi

Dişeti çekilmesi olan alanlarda sıcak, soğuk, tatlı, ekşi uyaranlara bağlı olarak oluşan hassasiyetlerin giderilmesi amacıyla uygulanan tedavi yöntemidir.

Splint uygulamaları

Periodontal problemi olan hastalarda dişin etrafındaki kemik kaybına bağlı olarak dişlerde hareketlilik gözlenebilir. Bu hareketliliği önlemek amacıyla dişleri birbirine bağlayarak geçici ve daimi splintler uygulanır.

Olası riskler: Splint kırılabilir. Dişlerde hassasiyet olabilir.

ONAY

Tüm ağzımın detaylı muayenesi yapıldı. Ayrıca ilgili bölümlerde hekimler tarafından hastalığın ne olduğu, tedavinin neden gerektiği, içerdiği riskler, oluşabilecek problemler, alternatif yöntemler, tedavi sonrası oluşabilecek değişiklikler, başarı olasılığı ve iyileşme sürecinde yaşanabilecek durumlar açıklandı.

Teşhis ve tedavi esnasında;

- Konsültasyon istenebileceği ve bunların tedavi sürecine katılabileceği,
- Kimlik bilgilerimin gizli tutularak anamnez bilgilerimin, radyolojik görüntülerimin, fotoğraflarımın, tetkik sonuçlarımın teşhis, bilimsel eğitim ve araştırma amaçlı kullanılabileceğini,
- Verilen randevulara aksatmadan gelinmesi ve hekimin tedavi ile ilgili öneri ve uygulamalarına uyulmasının tedavi sonuçlarımı doğrudan etkileyebileceği tarafıma açıklandı.

(LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BOŞLUĞA “Bu onam formunu, Okudum ve Anladım” yazarak imzalayınız.)

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Hastanın Yasal Temsilcisi-Yakınlık derecesi: